

PREPARANDO AL PACIENTE ANTES DEL TRATAMIENTO CON DUODOPA®

Checklist para neurólogos y personal sanitario

Duodopa®

GEL INTESTINAL LEVODOPA/CARBIDOPA



abbvie

A

2 SEMANAS ANTES DE LA PEG

1. **Citar al paciente de nuevo** para revalorar su estado clínico y reafirmar que se mantienen los criterios de selección.
2. **Comprobar que el paciente no tiene cirugías** digestivas previas que impidan realizar la PEG.
3. **Fijar fecha de inserción de la PEG** con el servicio de endoscopia.
4. **Programar el ingreso del paciente**, de acuerdo con esa fecha.
5. **Solicitar preoperatorio** incluyendo vitamina B12.
6. Si la sonda nasointestinal se va a colocar por endoscopias, **solicitar dos sedaciones** (una para la colocación de la sonda nasointestinal y la otra para la colocación de la PEG).
7. **Si el paciente toma terapia anticoagulante**, tenerlo en cuenta para realizar la conversión a otras terapias para poder realizar la PEG.

B

1 SEMANA ANTES DE LA PEG

1. **Realizar la retirada de agonistas dopaminérgicos** de manera progresiva según tolerancia del paciente excepto apomorfina (por su vida media corta se puede mantener hasta el comienzo de optimización con Duodopa®). Si es necesario se puede subir levodopa oral.
2. **Hacer petición de medicación** para tenerlo antes de final de semana.
3. **Hacer petición de ingreso del paciente en el hospital** para el domingo por la mañana (24 horas para migración de sonda nasointestinal).

C

PRE-INGRESO

1. **Dejar pedido Rx abdominal** para el lunes a primera hora para comprobación de la correcta posición de la sonda nasoduodenal.
2. **Dejar pautado Motilium** (c/8h: De-Co-Ce) para ayudar a la progresión de la sonda nasoduodenal. Se aconseja alimentación normal rica en fibra para favorecer la colocación de la sonda por migración pasiva.
3. **Dejar registrado en historia clínica** la suspensión de levodopa oral y apomorfina a las 24 horas del domingo.
4. **Dejar petición de Duodopa® a farmacia hospitalaria** para tener la medicación en planta el lunes a primera hora o incluso el mismo domingo (recordar que se tiene que conservar en nevera).
5. En caso de necesitar endoscopia para la colocación de la sonda nasoduodenal, **dejar al paciente en ayunas** a las 24 horas del día anterior a realizar ésta.

D

SEMANA DE OPTIMIZACIÓN

(lunes-optimización)

1. **Realizar Rx** y comprobar que la sonda está colocada correctamente.
2. **Calcular la dosis** y convertir mg orales de levodopa a ml gel Duodopa[®].
3. **Iniciar la optimización** del paciente.
4. **Explicar todo el proceso de nuevo al paciente** y realizar educación tanto sanitaria como del dispositivo al paciente, familia y todo el personal sanitario que así lo requiera. **Permanecer con el paciente** todo el tiempo que sea necesario.
5. La noche anterior a la inserción de la PEG **dejar en dieta absoluta** al paciente.

E

DÍA PEG

1. En este día **se puede poner la infusión de Duodopa®**. El paciente está más confortable y el servicio de endoscopia puede realizar la técnica en mejores condiciones (el paciente no está rígido y es más colaborador).
2. **Pautar la profilaxis antibiótica** para la PEG.
3. **Realizar higiene de boca** para procedimiento PEG.
4. **Llevar material para PEG** al servicio de endoscopias (sonda PEG 15 Fr. y PEI 9 Fr.).
5. **Después de la PEG, subir al paciente a planta** con la infusión de Duodopa® puesta. **Mantener en ayunas de 6-8 horas** tras la tolerancia, pautar calmantes si hubiera dolor.

F

ALTA PACIENTE

1. **Realizar cura** del estoma.
2. **Reforzar la educación y aclarar dudas** al paciente, familia y personal sanitario si fuese necesario antes del alta.
3. **Dejar receta de Duodopa[®]** para que el paciente recoja en farmacia hospitalaria la medicación para el domicilio.
4. **Dejar un número de teléfono de contacto** para dar soporte técnico y educacional al paciente y familia.
5. **Dejar pauta de rescate de medicación oral** para contingencias.
6. **Pedir al paciente que controle su peso** el día anterior a la visita de seguimiento con su neurólogo.
7. **Confirmar cita de control** en consulta de neurología y **pautar visitas** con el neurólogo.

abbvie